

Existen otros que **protegen la mucosa gástrica**.

Sales de bismuto (Gastrodenol). Debe tomarse antes de las comidas.

Sucralfato (Gastral, Urbal) Deben tomarse antes de las comidas.

Misoprostol (Cytotec). Debe tomarse con las comidas. Puede provocar aborto.

Acexamato de zinc (Copinal) Debe tomarse con o después de las comidas

Deben tomarse bajo prescripción médica.

No deben utilizarse en embarazadas ni madres lactantes.

Plantas medicinales: la manzanilla dulce, manzanilla amarga, menta verde y mielenrama tienen acción antiácida. **Deben tomarse en infusión después de las comidas.** Las personas alérgicas deben tomarlas con precaución. Pueden ser usadas por embarazadas y madres lactantes.



RECUERDE:

Si los síntomas persisten debe consultar a su médico, ya que pueden deberse a algún tipo de enfermedad.



**NO SE AUTOMEDIQUE
ANTE CUALQUIER DUDA
CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

**“Estamos para ayudarle a
mantener su salud”**

TU FARMACIA TE INFORMA



MEDICAMENTOS PARA LA ACIDEZ

Farmacia Molinero
C/ Fátima, 33
28943 Fuenlabrada
Tel.: 91 607 40 10
info@farmaciamolnero.com
www.farmaciamolnero.com

MEDICAMENTOS PARA LA ACIDEZ

La acidez, la indigestión y el ardor de estómago son términos habituales para describir las molestias gástricas.



Son medicamentos destinados a disminuir el ardor, la acidez y la indigestión. Impiden y/o neutralizan el exceso de ácido secretado por el estómago.

Los **antiácidos** neutralizan el ácido que se produce en el estómago, reduciendo el dolor.

Bicarbonato sódico (Bicarbonato, Sal de Frutas).
El alivio del dolor es



inmediato. Tomado en exceso puede producir más acidez. No deben utilizarlo hipertensos, embarazadas, madres lactantes.

Sales de aluminio (Alugel, Pepsamar).

Sales aluminio, calcio, magnesio (Gelodrox, Rennie, Secrepat. Tanasid)

Almagato (Almax)

Magaldrato (Bemolan, Minoton)

Algeldrato (Alugel, Maalox, Winton)

El alivio del dolor es más lento, pero más prolongado en el tiempo. Deben tomarse entre **15 y 20 minutos después de las comidas**.



Los comprimidos deben masticarse o disolverse en la boca antes de tragarlos con un vaso de agua. No se deben tomar con leche. Producen estreñimiento

No deben utilizarlos madres lactantes ni enfermos renales sin consultar a su médico.

Pueden interactuar con muchos medicamentos, por lo que es recomendable espaciar tomas.

Algunos **impiden la cantidad de ácido que se produce en el estómago** y ayudan a prevenir el ardor. **Su efecto no es inmediato.**

Cimetidina (Aliveg, Fremet, Mansal, Tagamet)

Ranitidina (Alquen, Arcid, Ardoral, Coralen, Quantor, Ranix.

Tanidina, Terposen, Toriol, Zantac)



Famotidina (Cronol, Fanox. Gastrion, Gastrodomina, Invigan, Nulcerin, Pepcid, Pepdual, Tamin)

Se toman **una vez al día después de cenar** o dos veces (desayuno y cena).



Omeprazol (Ceprandal, Elgam, Emepron, Losec, Norpramin, Nucleosina, Omapren, Parizac, Pepticum, Ulceran, Ulcometion)

Lansoprazol (Monolimum, Opiren, Pro-Ulco)

Pantoprazol (Anagastra, Pantecta, Ulcotenal)

Deben tomarse siempre bajo prescripción médica, **una vez al día 15 minutos antes del desayuno.**



**terminar tratamiento
aunque mejoren los síntomas**

No deben usarse en embarazadas, madres lactantes, enfermos renales, hepáticos o con cáncer de estómago

ANTES DE TOMARLOS CONSULTE A SU FARMACÉUTICO, ya que **pueden interferir con muchos medicamentos.**



Farmacia Molinero

Fátima, 33

28943 Fuenlabrada

Tel.: 91 607 40 10 · info@farmaciamoliner.com

www.farmaciamoliner.com